
VASCULAR ACCESS DEVICES




MEDEREN

SAFE VASCULAR ACCESS

BY MEDEREN ®

Arpea

ARTERIAL PERIPHERAL ACCESS



BY MEDEREN ®

Cenvéa

CENTRAL VENOUS ACCESS



BY MEDEREN ®

Pevea

PERIPHERAL VENOUS ACCESS



BY MEDEREN ®
Arpea

ARTERIAL PERIPHERAL ACCESS

Линейка Arpea компании Mederen представлена катетерами для обеспечения периферического артериального доступа.

Доступные размеры:

- 22G (6.4 cm);
- 20G (8/10 cm);
- 18G (10 cm).



Прямой нитиноловый проводник
с рентгенконтрастной меткой и мягким кончиком для легкого и безопасного введения в сосуд

Стилет
для облегчения введения катетера
(только для вариантов исполнения наборов с размером катетера 18G и 20G)

PUR рентгенконтрастный артериальный катетер
с павильоном Луер Лок. Рекомендуемое время использования – до 30 дней

Фиксатор с крыльями
для обеспечения бесшовной фиксации катетера к коже пациента

Игла пункционная
из нержавеющей стали с павильоном с указателем направления среза иглы в виде стрелки

Ссылка на видео-инструкцию

MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

REF	Размер катетера, G	Длина катетера, см	Длина проводника	Игла пункционная, G
MAP-20G8	20	8	25	20
MAP-20G10	20	10		
MAP-22G6	22	6,4		21

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvea®

CENTRAL VENOUS ACCESS

Линейка Cenvea компании Mederen охватывает полный диапазон устройств для центрального венозного доступа:

- Центральные венозные катетеры (CVC);
- Катетеры для краткосрочного (острого) диализа (HC Short Term);
- Катетеры для долгосрочного (хронического) диализа (HC Long Term);
- Мидлайн катетеры (Midline);
- Периферически имплантируемые центральные венозные катетеры (PICC);
- Полностью имплантируемые венозные порт-системы (Implantable Venous Port).



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ CVC


Проводниковый шприц

с каналом для введения в него проводника без отсоединения от пункционной иглы, что снижает риск воздушной эмболии, кровотечения, диспозиции иглы, контакта с кровью пациента.



Диспенсер с J-образным проводником

для введения проводника одной рукой, что упрощает процедуру постановки и экономит время. Кроме того, особая конструкция диспенсера позволяет применять методику с УЗ контролем интравазального заведения J-образного проводника без аспирационной пробы (без использования шприца).



Игла пункционная

с конусовидным павильоном с эргономичными рифлеными лепестками-упорами для удобного и надежного захвата.



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ CVC

Дилататор из пластика

для формирования рабочего канала



Фиксирующие крылья

для крепления катетера к коже с помощью шовного материала



Заглушки инфузионные

по числу каналов катетера



Повязка адгезивная с хлоргексидином

для обеспечения эффективной антимикробной защиты во время стояния катетера за счет подавления роста кожной микрофлоры (уровень доказательности Ia)*.

Повязка комбинированная - по периметру она усилена широкой окантовкой из нетканого материала, а в центральной части имеет прозрачное окно из полиуретановой пленки с гидрогелевой хлоргексидиновой подушечкой.

Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.




Аппликатор с хлоргексидином

для подготовки кожи пациента перед установкой катетера. Тампон пропитан 2% раствором хлоргексидина глюконата в 70% изопропиловом спирте. Имеет пористую структуру, позволяя раствору проникнуть в первые 5 слоев эпидермиса, содержащих около 80% микроорганизмов. Антимикробная активность сохраняется на протяжении 7 дней (уровень доказательности Ia)**.

Спектр-действия: эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая MRSA (метициллин-резистентныые золотистые стафилококки), VRE (ванкомицин-резистентные энтерококки), CRE (карбопенем-резистентные энтеробактерии), Clostridium difficile, Acineobacter, вирусы и грибы.





* 1. Maki DG. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Bloodstream Infection: A Prospective Comparative Study in Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.
2. Bashir MH, Olson LK, Walters SA. Suppression of regrowth of normal skin flora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconate-prepped skin. Am J Infect Control. 2012; 40(4): 344-8.
3. Eyberg C. A Controlled Randomized Prospective Comparative Study to Evaluate the Ease of Use of a Transparent Chlorhexidine Impregnated Gel Dressing Versus A Chlorhexidine Disk in Healthy Volunteers. Journal of the Association for Vascular Access (JAVA); 2008;13(3).

** 1. Beausoleil C, Comstock SL, Werner D, Li L, Eby JM, Zook EC. Antimicrobial persistence of two alcoholic preoperative skin preparation solutions. J Hosp Infect. 2022 Nov;129:8-16.
2. Margaret McCann , Fidelma Fitzpatrick , George Mellotte , Michael Clarke Is 2% chlorhexidine gluconate in 70% isopropyl alcohol more effective at preventing central venous catheter-related infections than routinely used chlorhexidine gluconate solutions: A pilot multicenter randomized trial.


MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ CVC

Повязка адгезивная 10х12 см или 3,8х4,5 см

для фиксации катетера на теле пациента и защиты места его введения от микробной контаминации

Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.



Фиксатор бесшовный

для фиксации катетера в области хаба катетера на теле пациента



Чехол адгезивный для УЗИ датчика с фиксаторами

для обеспечения асептики при выполнении ультразвуковых процедур без использования геля





Благодаря вышеперечисленным опциям комплектации CVC Cenvea полностью соответствуют:

- Действующему Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской от 28 января 2021 года №4 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 25 мая 2022 года);
- Федеральным клиническим рекомендациям «По организации оптимального венозного доступа у детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями» от 2015 г.;
- Федеральным клиническим рекомендациям «По проведению катетеризаций подключичной и других центральных вен» от 2019 г.;
- Клиническим рекомендациям: «Профилактика катетер ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным катетером (ЦВК)» от 2017 г.;
- Методическому руководству «Эпидемиология и профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным катетером» от 2023 г.

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АДГЕЗИВНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ УЗИ



1. Наденьте чехол на руку



2. Снимите защиту с клейкого слоя



3. Присоедините УЗИ-датчик к липкой полосе



4. Начните разворачивать чехол



5. Продолжайте разворачивать чехол по длине датчика и шнура




6. Закрепите чехол фиксаторами из комплекта.

7. Нанесите стерильную жидкость (или стерильный гель) на кожу пациента и начните сканирование

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ПРЕИМУЩЕСТВА АДГЕЗИВНОГО ЧЕХЛА ДЛЯ УЗИ







- Высокое качество изображения.
- Уменьшение риска инфицирования. Благодаря адгезивному слою отсутствует необходимость использования геля для УЗИ *.

* 1. Oleszkowicz SC, Chittick P, Russo V, Keller P, Sims M, Band J. «Infections Associated with Use of Ultrasound Transmission Gel: Proposed Guidelines to Minimize Risk» Infection Control and Hospital Epidemiology Dec. 2012, vol. 33, no. 12.
2. Esteban C. Nannini, Adriana Ponessa, Rosa Muratori, Patricia Marchiaro, Viviana Ballerini, Luis Flynn, Adriana S. Limansky «Polyclonal outbreak of bacteremia caused by Burkholderia cepaciacomplex and the presumptive role of ultrasound gel» The Brazilian Journal of Infectious Diseases 2015;19(5):543-545.
3. Shaban RZ, Maloney S, Gerrard J, Collignon P, Macbeth D, Cruickshank M, Hume A, Jennison AV, Graham RMA, Bergh H, Wilson HL, Derrington P. «Outbreak of health care-associated Burkholderiacenocepacia bacteremia and infection attributed to contaminated sterile gel used for central line insertion under ultrasound guidance and other procedures» AJIC 45 (2017) 954-8.
4. Centers for Disease Control and Prevention «Pseudomonas aeruginosa respiratory tract infections associated with contaminated ultrasound gel used for transesophageal echocardiography - Michigan, December 2011-January 2012.» MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Apr 20;61:262-4.


MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa®

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ (CVC)

Доступные размеры:

- Одноканальные – 22G, 20G, 18G, 16G, 14G;
- Двухканальные – 5F, 7F;
- Трехканальные – 5,5F, 7F, 8.5F.



Крылья с отверстиями
для подшивания катетера обеспечивают поддержку и гибкость во время движения пациента

Мягкий кончик
снижает риск повреждения и раздражения эндотелия, минимизирует риск перфорации сосудистой стенки

Термопластичная рентгенконтрастная трубка катетера
из полиуретана размягчается при температуре тела для уменьшения возможности травмы сосуда

Зажимы «Robert clamp»
на удлинительных инфузионных линиях всех типов катетеров позволяют одной рукой быстро и безопасно перекрывать линию

Маркировка глубины введения
для контроля установки катетера

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПЛЕКТАЦИИ НАБОРОВ CVC

Дилататор



Заглушка инфузионная



Крылья фиксирующие





Катетер центральный венозный одно-, двух-, трехканальный с зажимами Robert Clamp

Фиксатор бесшовный



Повязка адгезивная 3,8х4,5 см



Повязка адгезивная 10х12 см






Проводник

Игла пункционная

18G 70 мм 20G 50 мм 20G 40



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Базовая комплектация включает: катетер центральный венозный одноканальный/двухканальный/трехканальный, проводник стальной, иглу пункционную, дилататор, крылья фиксирующие, фиксатор бесшовный, повязку адгезивную и заглушку инфузионную.

REF	Размер катетера	Длина катетера, см	Количество каналов	Длина проводника, см	Размер дилататора, F	Размер иглы пункционной, G
MVC1M-14G20	14 G	20	1	60	8	18
MVC1M-16G20	16 G				7	
MVC1M-18G20	18 G				5	20
MVC2M-7F20	7F		2		8	18
MVC3M-7F20			3			
MVC3M-8.5F20	8,5F		3		9	

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПЛЕКТАЦИИ НАБОРОВ CVC

Дилататор



Заглушка инфузионная - 3 шт.



Игла пункционная

18G 70 мм

20G 50 мм

20G 40 мм





Катетер центральный венозный одно-, двух-, трехканальный с зажимами Robert Clamp

Повязка адгезивная с хлоргексидином



Фиксатор бесшовный



Чехол адгезивный для УЗИ датчика





Шприц проводниковый

Проводник



Крылья фиксирующие

Аппликатор с хлоргексидином



На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Расширенная комплектация вместо адгезивной повязки* содержит повязку с хлоргексидином и чехол для УЗИ.

REF	Размер катетера	Длина катетера, см	Количество каналов	Длина проводника, см	Размер дилататора, F	Размер иглы пункционной, G
MVC1PN-18G20	18G	20	1	60	5	20
MVC1PN-20G8*	20G	8		50	4	
MVC1PN 20G13*		13				
MVC2PN-5F8	5F	8	2		6	
MVC2PN-5F13		13				
MVC3PN-5.5F8	5,5F	8	3			
MVC3PN-5.5F13		13				
MVC3PN-8.5F20	8,5F	20		60	9	18

* Наборы с катетером 20G имеют в составе повязку адгезивную без хлоргексидиновой подушки

Максимальная комплектация дополнительно включает аппликатор с хлоргексидином.

REF	Размер катетера	Длина катетера, см	Количество каналов	Длина проводника, см	Размер дилататора, F	Размер иглы пункционной, G
MVC1PN-14G20A	14G	20	1	60	8	18
MVC1PN-16G20A	16G				7	
MVC2PN-7F20A	7F	20	2		8	
MVC3PN-7F20A		20	3			

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

Cenvéa BY MEDEREN HD КОМПОНЕНТЫ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ (SHORT TERM)


Проводниковый шприц

с каналом для введения в него проводника без отсоединения от пункционной иглы, что снижает риск воздушной эмболии, кровотечения, диспозиции иглы, контакта с кровью пациента.



Диспенсер с J-образным проводником

для введения проводника одной рукой, что упрощает процедуру постановки и экономит время. **Кроме того, особая конструкция диспенсера позволяет применять методику с УЗ контролем интравазального заведения J-образного проводника без аспирационной пробы (без использования шприца).**



Игла пункционная

с конусовидным павильоном с эргономичными рифлеными лепестками-упорами для удобного и надежного захвата.




MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ (SHORT TERM)

Дилататор из пластика

для формирования рабочего канала.



Дилататор расщепляемый для серий Cenvea HD S и HD D

с гемостатическим клапаном для удобного введения катетера и снижения риска потери крови и попадания воздуха в процессе катетеризации



Скальпель безопасный для серий Cenvea HD S и HD D

со специальным слайдером, который способствует обратному ходу лезвия в корпус рукоятки путем его сдвига одним пальцем, тем самым исключается риск гемоконтактных инфекций при утилизации.



Заглушки инфузионные

по числу каналов катетера.



Фиксатор бесшовный

для фиксации катетера в области хаба катетера на теле пациента



Аппликатор с хлоргексидином

для подготовки кожи пациента перед установкой катетера. Тампон пропитан 2% раствором хлоргексидина глюконата в 70% изопропиловом спирте. Имеет пористую структуру, позволяя раствору проникнуть в первые 5 слоев эпидермиса, содержащих около 80% микроорганизмов. Антимикробная активность сохраняется на протяжении 7 дней (уровень доказательности Ia)**.

Спектр-действия: эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая MRSA (метициллин-резистентныые золотистые стафилококки), VRE (ванкомицин-резистентные энтерококки), CRE (карбопенем-резистентные энтеробактерии), Clostridium difficile, Acineobacter, вирусы и грибы.





MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ (SHORT TERM)

Повязка адгезивная 10х12 см

для фиксации катетера на теле пациента и защиты места его введения от микробной контаминации

Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.



Повязка адгезивная с хлоргексидином

для обеспечения эффективной антимикробной защиты во время стояния катетера за счет подавления роста кожной микрофлоры (уровень доказательности Ia)*.

Повязка комбинированная - по периметру она усилена широкой окантовкой из нетканого материала, а в центральной части имеет прозрачное окно из полиуретановой пленки с гидрогелевой хлоргексидиновой подушечкой.

Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.



Чехол адгезивный для УЗИ датчика с фиксаторами

для обеспечения асептики при выполнении ультразвуковых процедур без использования геля.





Благодаря вышеперечисленным опциям комплектации CVC Cenvea полностью соответствуют:

- Действующему Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской от 28 января 2021 года N 4 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 25 мая 2022 года);
- Федеральным клиническим рекомендациям «По организации оптимального венозного доступа у детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями» от 2015 г.;
- Федеральным клиническим рекомендациям «По проведению катетеризаций подключичной и других центральных вен» от 2019 г.;
- Клиническим рекомендациям: «Профилактика катетер ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным катетером (ЦВК)» от 2017 г.

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® HD

HEMODIALYSIS CATHETER SHORT TERM

Доступные размеры:

- Двухканальные – 8F, 11.5F, 12F;
- Трехканальные – 8,5F, 12F.

Зажимы «Robert clamp»
с цветовой кодировкой и маркировкой объема заполнения на удлинительных линиях катетеров позволяют легко идентифицировать артериальный и венозный просветы

Трехканальные модификации
позволяют проводить инфузии, а также осуществлять забор крови на анализ. Устраняют необходимость установки дополнительных устройств для сосудистого доступа


Вращающиеся крылья
с отверстиями для подшивания катетера обеспечивают поддержку и гибкость во время движения пациента

Маркировка глубины введения
для контроля установки катетера


Термопластичная рентгенконтрастная трубка катетера
из полиуретана размягчается при температуре тела для уменьшения возможности травмы сосуда

Удлинительные линии 2-х типов
доступны прямые и изогнутые модификации для комфорта пациента

Мягкий кончик
снижает риск повреждения и раздражения эндотелия, минимизирует риск перфорации сосудистой стенки



Конструкция просвета Double-D
имеет увеличенный внутренний диаметр для обеспечения постоянной и равномерной скорости потока




MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ (SHORT TERM)

Катетер центральный венозный
гемодиализный двух-, трехканальный



Дилататор 10F



Дилататор 12F

Заглушка
инфузионная - 2 шт



Фиксатор
бесшовный



Повязка адгезивная
с хлоргексидином



Чехол адгезивный
для УЗИ датчика







Шприц
проводниковый



Игла пункционная
18G 70 мм





Проводник

Аппликатор
с хлоргексидином



На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® HD

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

REF	Размер катетера, F	Длина катетера, см	Количество каналов	Форма удлинительных линий	Размер дилататора, F	Размер иглы пункционной, G	Наличие аппликатора с хлоргексидином в наборе
MVCH2P-12F20A	12	20	2	прямые	10 12	18	+
MVCH3P-12F20C	12	20	3	изогнутые	10 12	18	-

MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

НОВИНКА
2026

BY MEDEREN Cenvéa® HD

HEMODIALYSIS CATHETER SHORT TERM HD S/D

Доступные размеры:


- Двухканальные – 12F, 14F.

Зажимы «Robert clamp»
с цветовой кодировкой и маркировкой объема заполнения на удлинительных линиях катетеров позволяют легко идентифицировать артериальный и венозный просветы

Вращающиеся крылья
с отверстиями для подшивания катетера обеспечивают поддержку и гибкость во время движения пациента

Маркировка глубины введения
для контроля установки катетера

Термопластичная рентгенконтрастная трубка катетера
из полиуретана размягчается при температуре тела для уменьшения возможности травмы сосуда



Катетер со ступенчатым кончиком (HD S)

- **АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПОРТ** оптимизирует за счет своей конструкции и наличия боковых отверстий, что также снижает рециркуляцию.
- **МЯГКИЙ КОНЧИК** снижает риск повреждения и раздражения эндотелия, минимизирует риск перфорации сосудистой стенки при постановке.
- **ВЕНОЗНЫЙ ПОРТ** значительно отделен от артериального порта, что улучшает поток и минимизирует рециркуляцию.

Катетер с симметричным кончиком* (HD D)

- Обеспечивает наименьшую рециркуляцию крови.
- **БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ** снижают риск окклюзии и вероятности тромбообразования.

* 1. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury 2012
2. Huriaux L., Haemodialysis catheters in the intensive care unit, Anaesth. Crit. Care Pain Med. 2017

MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® HD

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ HD S И HD D (SHORT TERM)

Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный
с прямыми удлинительными линиями ступенчатый/симметричный



Шприц
проводниковый



Игла пунктионная
18G 70 мм



ступенчатый



симметричный



Скальпель
безопасный

Дилататор



Дилататор



Дилататор
расщепляемый



Повязка адгезивная
с хлоргексидином




Фиксатор
бесшовный



Чехол адгезивный
для УЗИ датчика



Проводник



Заглушка
инфузионная - 2 шт

Аппликатор
с хлоргексидином





На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наборы для катетеризации центральных вен гемодиализные Cenvea HD S и D

REF	Код	Размер катетера, F	Эффективная длина катетера, см	Количество каналов	Форма катетера	Форма удлинительных линий	Тип дистального кончика катетера
MVCHS2P-14F20A	HD S	14	20	2	Прямая	Прямая	Ступенчатый
MVCHD2P-12F20A	HD D	12	20	2	Прямая	Прямая	Симметричный

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® HD

КОМПОНЕНТЫ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ (LONG TERM)


Проводниковый шприц

с каналом для введения в него проводника без отсоединения от пункционной иглы, что снижает риск воздушной эмболии, кровотечения, диспозиции иглы, контакта с кровью пациента.



Диспенсер с J-образным проводником

для введения проводника одной рукой, что упрощает процедуру постановки и экономит время. Кроме того, особая конструкция диспенсера позволяет применять методику с УЗ контролем интравазального заведения J-образного проводника без аспирационной пробы (без использования шприца).



Игла пункционная

с конусовидным павильоном с эргономичными рифлеными лепестками-упорами для удобного и надежного захвата.




MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® HD

КОМПОНЕНТЫ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ (LONG TERM)

Дилататор из пластика

для формирования рабочего канала.



Дилататор расщепляемый

с гемостатическим клапаном для удобного введения катетера и снижения риска потери крови и попадания воздуха в процессе катетеризации



Туннелер из стали

для формирования подкожного туннеля для проведения катетера



Скальпель безопасный

со специальным слайдером, который способствует обратному ходу лезвия в корпус рукоятки путем его сдвига одним пальцем, тем самым исключается риск гемоконтактных инфекций при утилизации.



Заглушки инфузионные

по числу каналов катетера.



Салфетки марлевые



Игла иньекционная

для выполнения местной анестезии



Шприц иньекционный



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ (LONG TERM)

Повязка адгезивная с хлоргексидином

для обеспечения эффективной антимикробной защиты во время стояния катетера за счет подавления роста кожной микрофлоры (уровень доказательности Ia)*.

Повязка комбинированная – по периметру она усилена широкой окантовкой из нетканого материала, а в центральной части имеет прозрачное окно из полиуретановой пленки с гидрогелевой хлоргексидиновой подушечкой.


Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.



Аппликатор с хлоргексидином

для подготовки кожи пациента перед установкой катетера. Тампон пропитан 2% раствором хлоргексидина глюконата в 70% изопропиловом спирте. Имеет пористую структуру, позволяя раствору проникнуть в первые 5 слоев эпидермиса, содержащих около 80% микроорганизмов. Антимикробная активность сохраняется на протяжении 7 дней (уровень доказательности Ia)**.

Спектр-действия: эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая MRSA (метициллин-резистентныые золотистые стафилококки), VRE (ванкомицин-резистентные энтерококки), CRE (карбопенем-резистентные энтеробактерии), Clostridium difficile, Acineobacter, вирусы и грибы.



Чехол адгезивный для УЗИ датчика с фиксаторами

для обеспечения асептики при выполнении ультразвуковых процедур без использования геля.





* 1. Maki DG. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Bloodstream Infection: A Prospective Comparative Study in Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.
2. Bashir MH, Olson LK, Walters SA. Suppression of regrowth of normal skin flora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconate-prepped skin. Am J Infect Control. 2012; 40(4): 344-8.
3. Eyberg C. A Controlled Randomized Prospective Comparative Study to Evaluate the Ease of Use of a Transparent Chlorhexidine Impregnated Gel Dressing Versus A Chlorhexidine Disk in Healthy Volunteers. Journal of the Association for Vascular Access (JAVA); 2008;13(3).

** 1. Beausoleil C, Comstock SL, Werner D, Li L, Eby JM, Zook EC. Antimicrobial persistence of two alcoholic preoperative skin preparation solutions. J Hosp Infect. 2022 Nov;129:8-16.
2. Margaret McCann , Fidelma Fitzpatrick , George Mellotte , Michael Clarke Is 2% chlorhexidine gluconate in 70% isopropyl alcohol more effective at preventing central venous catheter-related infections than routinely used chlorhexidine gluconate solutions: A pilot multicenter randomized trial.

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

НОВИНКА
2026

BY MEDEREN Cenvéa® HD

HEMODIALYSIS CATHETER LONG TERM HD S/D/PRO

Доступные размеры:

- Двухканальные – 14F, 14.5F, 15F.

Зажимы «Robert clamp»
с цветовой кодировкой и маркировкой объема заполнения на удлинительных линиях катетеров позволяют легко идентифицировать артериальный и венозный просветы

Вращающиеся крылья
с отверстиями для подшивания катетера обеспечивают поддержку и гибкость во время движения пациента

Дакроновая манжета
срастается с подкожной жировой клетчаткой, дополнительно противодействуя нежелательному смещению (дислокации) катетера и снижая частоту инфицирования подкожного канала

Термопластичная рентгенконтрастная трубка катетера из полиуретана (для катетеров HD Long D и Long Pro) и силикона (для HD Long S)
размягчается при температуре тела для уменьшения возможности травмы сосуда



Катетер со ступенчатым кончиком (HD Long S)

- **АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПОРТ** оптимизирует за счет своей конструкции и наличия боковых отверстий, что также снижает рециркуляцию.
- **ВЕНОЗНЫЙ ПОРТ** значительно отделен от артериального порта, что улучшает поток и минимизирует рециркуляцию.

Катетер с симметричным кончиком* (HD Long D и HD Long Pro)

- Обеспечивает наименьшую рециркуляцию крови.
- **БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ** снижают риск окклюзии и вероятности тромбообразования.

* 1. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury 2012
2. Huriaux L., Haemodialysis catheters in the intensive care unit, Anaesth. Crit. Care Pain Med. 2017

MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГЕМОДИАЛИЗНЫХ НАБОРОВ HD LONG S/D/ PRO (LONG TERM)

Катетер центральный венозный гемодиализный двухканальный с прямыми удлинительными линиями ступенчатый/симметричный



Шприц инъекционный




Шприц проводниковый



Игла инъекционная



Игла пункционная 18G 70 мм



Дилататор

Дилататор

Туннелер из стали



Дилататор расщепляемый



Салфетки марлевые




Скальпель безопасный



Повязка адгезивная с хлоргексидином



Проводник



Заглушка инфузионная - 2 шт

Чехол адгезивный для УЗИ датчика



Аппликатор с хлоргексидином





На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наборы для катетеризации центральных вен гемодиализные Cenvea HD Long Pro

REF	Размер катетера, F	Эффективная длина катетера, см	Количество каналов	Форма катетера	Форма удлинительных линий	Тип дистального кончика катетера	Материал катетера
MVCHLP2-14.5F23A	14.5	23	2	Прямая	Прямая	Симметричный	Полиуретан
MVCHLP2-14.5F27	14.5	27	2	Прямая	Прямая	Симметричный	Полиуретан

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® MIDLINE

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ MIDLINE

Диспенсер с прямым проводником

для введения проводника одной рукой, что упрощает процедуру постановки и экономит время



Коннектор безыгольный


(по числу каналов катетера) для удобного и безопасного доступа для иньекций, аспираций и инфузий без использования иглы. Совместимы с химиотерапевтическими препаратами, липидами, этиловым спиртом. Создают закрытую систему.

Положительного типа 300 psi (для CT-линеек)



Игла пункционная эхогенная безопасная

с конусовидным павильоном и устройством защиты от укола для снижения риска травмирования медицинского персонала при извлечении иглы.



Скальпель безопасный

со специальным слайдером, который способствует обратному ходу лезвия в корпус рукоятки путем его сдвига одним пальцем, тем самым исключается риск гемоконтактных инфекций при утилизации.



Лента измерительная



Жгут венозный



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ MIDLINE

Интродьюсер расщепляемый

для удобного введения катетера и снижения риска потери крови и попадания воздуха в процессе катетеризации



Шприц инъекционный



Фиксатор бесшовный

для фиксации катетера в области хаба катетера на теле пациента



Повязка адгезивная с хлоргексидином

для обеспечения эффективной антимикробной защиты во время стояния катетера за счет подавления роста кожной микрофлоры (уровень доказательности Ia)*.

Повязка комбинированная - по периметру она усилена широкой окантовкой из нетканого материала, а в центральной части имеет прозрачное окно из полиуретановой пленки с гидрогелевой хлоргексидиновой подушечкой.

Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ MIDLINE

Аппликатор с хлоргексидином

для подготовки кожи пациента перед установкой катетера. Тампон пропитан 2% раствором хлоргексидина глюконата в 70% изопропиловом спирте. Имеет пористую структуру, позволяя раствору проникнуть в первые 5 слоев эпидермиса, содержащих около 80% микроорганизмов. Антимикробная активность сохраняется на протяжении 7 дней (уровень доказательности Ia)**.

Спектр-действия: эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая MRSA (метициллин-резистентныые золотистые стафилококки), VRE (ванкомицин-резистентные энтерококки), CRE (карбопенем-резистентные энтеробактерии), Clostridium difficile, Acineobacter, вирусы и грибы.



Чехол адгезивный для УЗИ датчика с фиксаторами

для обеспечения асептики при выполнении ультразвуковых процедур без использования геля.





* 1. Maki DG. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Bloodstream Infection: A Prospective Comparative Study in Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.
2. Bashir MH, Olson LK, Walters SA. Suppression of regrowth of normal skin flora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconate-prepped skin. Am J Infect Control. 2012; 40(4): 344-8.
3. Eyberg C. A Controlled Randomized Prospective Comparative Study to Evaluate the Ease of Use of a Transparent Chlorhexidine Impregnated Gel Dressing Versus A Chlorhexidine Disk in Healthy Volunteers. Journal of the Association for Vascular Access (JAVA); 2008;13(3).

** 1. Beausoleil C, Comstock SL, Werner D, Li L, Eby JM, Zook EC. Antimicrobial persistence of two alcoholic preoperative skin preparation solutions. J Hosp Infect. 2022 Nov;129:8-16.
2. Margaret McCann , Fidelma Fitzpatrick , George Mellotte , Michael Clarke Is 2% chlorhexidine gluconate in 70% isopropyl alcohol more effective at preventing central venous catheter-related infections than routinely used chlorhexidine gluconate solutions: A pilot multicenter randomized trial.

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvea® MIDLINE

MIDLINE

Катетеры Cenvea Midline и Cenvea Midline CT предназначены для обеспечения сосудистого доступа к венозному руслу пациентов (взрослых и детей) на срок не более 30 дней.

Доступные размеры и типы:

- Одноканальные стандартные/CT (высокопоточные) – 3F, 4F, 5F;
- Двухканальные стандартные/CT (высокопоточные) – 5F.



Адаптер Туохи Борст
позволяет промывать катетер физиологическим раствором и обеспечивает герметичность благодаря силиконовой мембране заглушки

Зажимы «Robert clamp»
на удлинительных инфузионных линиях всех типов катетеров позволяют одной рукой быстро и безопасно перекрывать линию

Термопластичная рентгенконтрастная трубка катетера из полиуретана
размягчается при температуре тела для уменьшения возможности травмы сосуда

Длина катетера – 20 см
В зависимости от позиционирования кончика катетера и места доступа могут использоваться как периферические (длительного стояния), так и как центральные венозные катетеры

Ссылка на видео-инструкцию

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

Cenvéa BY MEDEREN® MIDLINE

КОМПЛЕКТАЦИЯ MIDLINE

Midline catheter



Игла пункционная эхогенная безопасная



Интродьюсер расщепляемый



Жгут венозный



Шприц инъекционный



Фиксатор бесшовный



Аппликатор с хлоргексидином

Чехол адгезивный для УЗИ датчика



Лента измерительная



Коннектор безыгольный



Повязка адгезивная с хлоргексидином



Проводник

Скальпель безопасный



На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Cenvea Midline CT (с высокопоточным катетером)

REF	Размер катетера, F	Длина катетера, см	Количество каналов	Размер дилататора, F	Размер иглы пункционной, G
MVCM1CT-3F20EA	3	20	1	3,5	21
MVCM1CT-4F20EA	4	20	1	4,5	21

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® PICC

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ PICC

Диспенсер с прямым проводником

для введения проводника одной рукой, что упрощает процедуру постановки и экономит время



Коннекторы безыгольные

(по числу каналов катетера) для удобного и безопасного доступа для иньекций, аспираций и инфузий без использования иглы. Совместимы с химиотерапевтическими препаратами, липидами, этиловым спиртом. Создают закрытую систему.


Положительного типа 300 psi (для СТ-линеек)

Нейтрального типа



Игла пункционная эхогенная безопасная

с конусовидным павильоном и устройством защиты от укола для снижения риска травмирования медицинского персонала при извлечении иглы



Скальпель безопасный

со специальным слайдером, который способствует обратному ходу лезвия в корпус рукоятки путем его сдвига одним пальцем, тем самым исключается риск гемоконтактных инфекций при утилизации.



Лента измерительная



Жгут венозный



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® PICC

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ PICC

Интродьюсер расщепляемый

для удобного введения катетера и снижения риска потери крови и попадания воздуха в процессе катетеризации.



Интродьюсер расщепляемый

для пункции вены и установки неонатального катетера. Состоит из расщепляемой оболочки с крыльями, которые можно удалить после установки, разделив надвое



Повязка адгезивная 3,8х4,5 см

для фиксации катетера на теле пациента и защиты места его введения от микробной контаминации

Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.



Фиксатор бесшовный

для фиксации катетера в области хаба катетера на теле пациента.



Подушечки клейкие

для подкладывания под катетер, чтобы он не касался кожи неонатального пациента в месте выхода.



Заглушка инфузионная

для предотвращения попадания инфекций в катетер с дистальным клапаном.



Шприц инъекционный



Линия удлинительная и адаптеры с мягким кончиком

для осуществления доступа к катетеру с дистальным клапаном.



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® PICC

КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ PICC

Повязка адгезивная с хлоргексидином

для обеспечения эффективной антимикробной защиты во время стояния катетера за счет подавления роста кожной микрофлоры (уровень доказательности Ia)*.

Повязка комбинированная - по периметру она усилена широкой окантовкой из нетканого материала, а в центральной части имеет прозрачное окно из полиуретановой пленки с гидрогелевой хлоргексидиновой подушечкой.

Максимальное время эксплуатации у пациента – 7 дней.



Аппликатор с хлоргексидином

для подготовки кожи пациента перед установкой катетера. Тампон пропитан 2% раствором хлоргексидина глюконата в 70% изопропиловом спирте. Имеет пористую структуру, позволяя раствору проникнуть в первые 5 слоев эпидермиса, содержащих около 80% микроорганизмов. Антимикробная активность сохраняется на протяжении 7 дней (уровень доказательности Ia)**.

Спектр-действия: эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая MRSA (метициллин-резистентные золотистые стафилококки), VRE (ванкомицин-резистентные энтерококки), CRE (карбопенем-резистентные энтеробактерии), Clostridium difficile, Acineobacter, вирусы и грибы.






Чехол адгезивный для УЗИ датчика с фиксаторами


для обеспечения асептики при выполнении ультразвуковых процедур без использования геля.





Catheter ID Card





* 1. Maki DG. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Bloodstream Infection: A Prospective Comparative Study in Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.
2. Bashir MH, Olson LK, Walters SA. Suppression of regrowth of normal skin flora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconate-prepped skin. Am J Infect Control. 2012; 40(4): 344-8.
3. Eyberg C. A Controlled Randomized Prospective Comparative Study to Evaluate the Ease of Use of a Transparent Chlorhexidine Impregnated Gel Dressing Versus A Chlorhexidine Disk in Healthy Volunteers. Journal of the Association for Vascular Access (JAVA); 2008;13(3).

** 1. Beausoleil C, Comstock SL, Werner D, Li L, Eby JM, Zook EC. Antimicrobial persistence of two alcoholic preoperative skin preparation solutions. J Hosp Infect. 2022 Nov;129:8-16.
2. Margaret McCann , Fidelma Fitzpatrick , George Mellotte , Michael Clarke Is 2% chlorhexidine gluconate in 70% isopropyl alcohol more effective at preventing central venous catheter-related infections than routinely used chlorhexidine gluconate solutions: A pilot multicenter randomized trial.

MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvea® PICC

PICC

Катетеры Cenvea PICC и Cenvea PICC CT могут использоваться как для временного (не более 30 суток), так и для длительного (более 30 суток) внутривенного доступа.


- Длина катетера 60 см.
- Вводятся через периферические вены руки с дальнейшим размещением дистального кончика катетера в нижней трети верхней полой вены.

Доступные размеры и типы:

- Одноканальные стандартные/CT (высокопоточные) – 3F, 4F, 5F;
- Двухканальные стандартные/CT (высокопоточные) – 5F, 6F;
- Трехканальные стандартные/CT (высокопоточные) – 6F.

Зажимы «Robert clamp»
на удлинительных инфузионных линиях всех типов катетеров позволяют одной рукой быстро и безопасно перекрывать линию

Адаптер Туохи Борст
позволяет промывать катетер физиологическим раствором и обеспечивает герметичность благодаря силиконовой мембране заглушки



Термопластичная рентгенконтрастная трубка катетера из полиуретана
размягчается при температуре тела для уменьшения возможности травмы сосуда

Ссылка на видео-инструкцию

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvea® PICC


PICC WITH DISTAL VALVE

Катетеры Cenvea PICC с дистальным клапаном могут использоваться как для временного (не более 30 суток), так и для длительного (более 30 суток) внутривенного доступа.

Закрытый дистальный конец с клапаном позволяет уменьшать затраты и время на обслуживание катетера, так как отсутствует необходимость использовать гепарин.

Доступные размеры и типы:


- Одноканальные – 3F, 4F.



Предустановленный стилет облегчает установку катетера и придаёт ему необходимую для этого жесткость*

Трубка катетера из силикона с высокой биосовместимостью снижает риск возникновения тромбоза, флебита и катетер — ассоциированных инфекций при длительном использовании.

Принцип работы клапана



Аспирация
отрытие внутрь за счет отрицательного давления

Инфузия
открытие наружу за счет положительного давления

Клапан закрыт
при отсутствии воздействия нейтральное положение

* После извлечения стилета с коннектором к катетеру можно присоединить при помощи соединительного адаптера с мягким кончиком удлинительную линию (входят в состав набора)


MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® PICC

PICC NEONATE

Доступные размеры и типы:

- одноканальные стандартные – 1.9Fr, 2Fr.



Адаптер Туохи Борст
позволяет промывать катетер физиологическим раствором и обеспечивает герметичность благодаря силиконовой мембране заглушки

Термопластичная рентгенконтрастная трубка катетера из полиуретана
размягчается при температуре тела для уменьшения возможности травмы сосуда

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® PICC

КОМПЛЕКТАЦИЯ PICC

PICC



Игла пункционная эхогенная безопасная



Интродьюсер расщепляемый



Жгут венозный



Шприц инъекционный



Фиксатор бесшовный



Аппликатор с хлоргексидином

Чехол адгезивный для УЗИ датчика



Лента измерительная



Повязка адгезивная с хлоргексидином



Коннектор безыгольный



Проводник

Скальпель безопасный



На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® PICC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PICC CT

REF	Размер катетера, F	Длина катетера, см	Количество каналов	Размер иглы пункционной	Длина проводника, см	Размер расщепляемого интродьюсера, F	Наличие аппликатора с хлоргексидином в наборе	Тип дистального кончика катетера	Материал катетера
MVCP1CT-3F60EA	3	60	1	21	45	3,5	+	Открытый, без клапана	Полиуретан
MVCP1CT-4F60EA	4	60	1	21	45	4,5	+	Открытый, без клапана	Полиуретан
MVCP1CT-5F60E	5	60	1	21	45	5,5	-	Открытый, без клапана	Полиуретан
MVCP2CT-4F60E	4	60	2	21	45	4,5	-	Открытый, без клапана	Полиуретан
MVCP2CT-5F60E	5	60	2	21	45	5,5	-	Открытый, без клапана	Полиуретан

MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvéa® PICC

КОМПЛЕКТАЦИЯ PICC WITH DISTAL VALVE

Игла пункционная эхогенная безопасная



Интродьюсер расщепляемый



PICC

Заглушка инфузионная

Скальпель безопасный



Линии удлинительные и адаптеры с мягким кончиком



Повязка адгезивная с хлоргексидином



Лента измерительная



Фиксатор бесшовный



Проводник



Чехол адгезивный для УЗИ датчика




На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ PICC NEONATE

PICC Neonate



Подушечки клейкие



Интродьюсер расщепляемый



Повязка адгезивная



Жгут венозный



Шприц инъекционный



Лента измерительная



Аппликатор с хлоргексидином



Коннектор безыгольный



Чехол адгезивный для УЗИ датчика



На фото изображена максимально расширенная комплектация

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

PICC NEONATE

REF	Размер катетера, F	Длина катетера, см	Размер интродьюсера расщепляемого с пункционной иглой, G
MVCP1-1.9F40E	1,9	40	22

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com


КОМПОНЕНТЫ НАБОРОВ IMPLANTABLE VENOUS PORT



Памятка для пациента



Карточка пациента



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN Cenvea® PORT

IMPLANTABLE VENOUS PORT


Порт-системы Cenvea Port используются для длительного внутривенного доступа.

Доступные типы портов:

- Standard — применяется у пациентов с ожирением и избытком подкожной жировой клетчатки;
- Low Profile — обеспечивает более лёгкую установку благодаря уменьшенной версии камеры;
- Micro — используется в детской практике.

Доступные размеры катетеров:

- доступны в размерах от 4,5Fr до 7.8Fr.



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

REF	Размер катетера, Fr	Тип порта
0205-MVLPT-06	6	Low Profile
0205-MVLPT-07	7	Low Profile
0205-MVLPT-7.8	7,8	Low Profile
0205-MVMT- 4.5	4,5	Micro
0205-MVST-7.8	7,8	Standard

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN ®
Pevea

PERIPHERAL VENOUS ACCESS

Линейка Pevea компании Mederen представлена двумя типами катетеров для обеспечения периферического венозного доступа:

- Периферическими венозными катетерами (IV cannula);
- Мини-мидлайнами (Mini-midline).



MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN ®
Pevea

PERIPHERAL VENOUS ACCESS

Серия Pevea компании Mederen представлена катетерами для обеспечения периферического венозного доступа сроком до 3-х дней. Материалы изготовления катетеров – полиуретан (до 72 ч) и тефлон (до 48 ч).

Доступные размеры:

- от 14G до 26G.

Катетеры периферические венозные

С крыльями

С крыльями без перфораций

С крыльями стандартные



С крыльями и встроенным трёхходовым краном



С крыльями перфорированными

С крыльями перфорированными и инъекционным портом с самозащёлкивающейся крышкой стандартные



С крыльями перфорированными и инъекционным портом с самозащёлкивающейся крышкой безопасные



С крыльями маленькими (неонатальные)



Без крыльев

Без крыльев и без порта безопасные

С автозащитой



MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN ® Peyea

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	REF	Размер катетера, G
Катетер в/в с крыльями, без инъекционного порта, тефлон	1408-M102-16	16
	1408-M102-18	18
	1408-M102-20	20
	1408-M102-22	22
	1408-M102-24	24
Катетер внутривенный со встроенным трехходовым запорным краном, тефлон	1408-M103-20	20
Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой	1408-M106-14	14
	1408-M106-16	16
	1408-M106-18	18
	1408-M106-20	20
	1408-M106-22	22
	1408-M106-24	24
Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, тефлон	1408-M109-14	14
	1408-M109-16	16
	1408-M109-18	18
	1408-M109-20	20
	1408-M109-22	22
	1408-M109-24	24

Наименование	REF	Размер катетера, G
Катетер внутривенный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самоза-щелкивающейся крышкой, с ранней индикацией	1408-M108-24	24
Катетер в/в неонатальный с маленькими крыльями, без инъекционного порта, полиуретан	1408-M204-24	24
	1408-M204-26	26
Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, полиуретан	1408-M206-14	14
	1408-M206-16	16
	1408-M206-17	17
	1408-M206-18	18
	1408-M206-20	20
	1408-M206-22	22
	1408-M206-24	24
	1408-M206-26	26
Катетер в/в с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, с ранней индикацией, полиуретан	1408-M208-20	20
	1408-M208-22	22
	1408-M208-24	24
Катетер в/в безопасный с перфорированными крыльями и инъекционным портом с самозащелкивающейся крышкой, полиуретан	1408-M209-14	14
	1408-M209-16	16
	1408-M209-17	17
	1408-M209-18	18
	1408-M209-20	20
	1408-M209-22	22
	1408-M209-24	24

MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN ® Pevea PRO

PERIPHERAL VENOUS ACCESS

Серия Pevea Pro представлена катетерами — Mini-midline для обеспечения периферического венозного доступа сроком до 30 дней.





Доступные размеры:

- 3F, 4F, 5F; длина 8/10 cm.

PUR рентгенконтрастный катетер периферический венозный

может быть с интегрированным проводником для облегчения установки (для катетеров 4F и 5F).



Фиксатор с крыльями

для обеспечения бесшовной фиксации катетера к коже пациента.



Шприц инъекционный



Коннектор безыгольный

для удобного и безопасного доступа для инъекций, аспираций и инфузий без использования иглы. Совместим с химиотерапевтическими препаратами, липидами, этиловым спиртом. Создает закрытую систему.



Линия удлинительная

для осуществления доступа к катетеру.




MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

BY MEDEREN ®
Pevea PRO

В экстренных ситуациях мини-мидлайны могут быть использованы для катетеризации внутренней или наружной яремной вены (сроком не более 7 дней) а также в качестве мини-доступа.





Ссылка на видео-инструкцию


MEDEREN
MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

REF	Размер катетера, F	Длина катетера, см	Катетер с проводником
MVPC-3F8	3	8	-
MVPC-4F8	4	8	-
MVPCG-4F10	4	10	+
MVPCG-5F10	5	10	+

MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

АЛГОРИТМ ВЫБОРА СОСУДИСТОГО УСТРОЙСТВА *



* За основу взято Методическое руководство «Венозный доступ». Министерство Здравоохранения РФ. 2019

** Рекомендуемый приоритет выбора катетера


MEDEREN Neotech Ltd. Israel
mederen.com • info@mederen.com

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОИК/КАИК

МЕДИН

СУЛЬФАКРИЛАТ

Сульфакрилат — это тканевой адгезивный фиксатор (медицинский клей) на основе цианоакрилата последнего поколения, который повышает безопасность сосудистого доступа: надёжно фиксирует, герметизирует место выхода катетера из кожи и защищает от инфекций, обеспечивая максимальный комфорт для пациента и удобство для медперсонала.



Фиксация

Адгезивный фиксатор катетера фиксирует как сам катетер в месте введения, так и его хаб к коже, уменьшая движение, миграцию и выпадение катетера.

Герметизация

Клинические исследования показывают, что кожные адгезивы на основе цианакрилата полностью герметизируют место введения, способствуя минимизации внеплановых замен повязки, обусловленных экссудацией, кровотечением и др. в месте установки катетера.

Антимикробная защита

Цианоакрилат в исследованиях продемонстрировал антимикробную активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжей и грибов, обычно ассоциированных с КОИК/КАИК. Клинические исследования также показали, что он способен предотвращать распространение микроорганизмов за счёт иммобилизации микрофлоры кожи.





КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МЕДИН

СУЛЬФАКРИЛАТ

- **Обеспечивает прямую визуализацию места введения.** Позволяет наблюдать за состоянием кожи и ранними признаками осложнений (покраснение, отёк) без снятия повязки, что соответствует принципам «открытого» доступа).
- **Универсальность применения:** одно изделие подходит для фиксации любых типов катетеров.
- **Безопасен для использования у новорождённых и пациентов с чувствительностью к хлоргексидину.** Не содержит хлоргексидин, что исключает риск контактного дерматита и других реакций, и подходит для самой уязвимой группы пациентов.
- **Требует минимальной площади для фиксации.** Это делает продукт адаптивным для использования на любых анатомических участках, включая очень ограниченные пространства, и идеально подходит для самых маленьких пациентов, таких как недоношенные дети.





Рекомендован для использования со всеми типами сосудистых устройств:

- периферические венозные катетеры;
- мини-мидлайн катетеры;
- мидлайн катетеры;
- центральные венозные катетеры;
- PICC;
- диализные катетеры;
- артериальные катетеры;
- имплантируемые порт системы;
- другие чрескожные устройства.

MEDEREN Neotech Ltd. Israel

MEDEREN — международный производитель широкого ассортимента одноразовых медицинских изделий и медицинского оборудования.

Головной офис компании расположен в Тель-Авив-Яффа, Израиль.

В своей деятельности MEDEREN руководствуется основополагающими принципами оказания медицинской помощи в Израиле:

- передовые технологии диагностики и лечения;
- традиции индивидуального подхода;
- забота о каждом пациенте;
- соблюдение высочайших стандартов обеспечения безопасности.

MEDEREN предлагает широкий ассортимент продукции — от стерильных одноразовых медицинских изделий до медицинского оборудования, — который является результатом многолетней работы и опыта международной команды специалистов.



MEDEREN

CERTIFICATE

OF AUTHORIZED DISTRIBUTOR

This is to certify that the company

ALFAMEDEX Ltd.

ITN 7814653516, registered address:
18th V.O. line, 29, letter A, part of the premises 1-N, 35, 37-44,
St.-Petersburg, Russian Federation,199178

is an authorized distributor of MEDEREN products
on the territory of Russia and the CIS.

Certificate validity: 1st January 2023 to 31st December 2028

Authorized by General Director
S. Tchertkov

MEDEREN NEOTECH LTD.
Adress: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

6777016, Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel
Tel./Fax: +9 (723) 376-07-73

MEDEREN.COM • INFO@MEDEREN.COM